Гипорамин (таблетки)



Код АТХ:

- D06BB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Облепихи крушиновидной листьев экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки сублингвальные*** двояковыпуклые, с риской, от светло-серого или светло-серого с розоватым оттенком цвета до светло-коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями.

	1 таб.
сухой очищенный экстракт из листьев облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides)	20 мг

Вспомогательные вещества: сахар-рафинад (529.9 мг), какао порошок, ванилин, натрия карбоксиметилцеллюлоза, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
25 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный фитопрепарат. Обладает противовирусной активностью в отношении различных штаммов вирусов гриппа А и В, аденовирусов, парамиксовирусов, вирусов Herpes simplex, Varicella zoster, респираторно-синтициального вируса, цитомегаловируса, ВИЧ.

Действие препарата на репродукцию вирусов проявляется на ранних этапах их развития. Механизм действия связан с ингибирующим эффектом препарата на вирусную нейраминидазу.

In vitro Гипорамин индуцирует продукцию интерферонов в клетках крови и повышает содержание интерферона в крови.

In vitro препарат также оказывает умеренно выраженное противомикробное действие в отношении некоторых грамотрицательных и грамположительных бактерий, туберкулезных микобактерий, а также противогрибковое действие в отношении Candida и некоторых мицелиальных (плесневых) грибов.

Препарат малотоксичен. Не обладает аллергизирующими, мутагенными, тератогенными и канцерогенными свойствами. Не оказывает влияния на иммунный статус организма.

Фармакокинетика

Действие препарата Гипорамин является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания к применению:

Для лечения и профилактики:

— гриппа А и В;

— парагриппа;

— респираторно-синцитиальной, аденовирусной и других ОРВИ;

— ангин, развивающихся на фоне ОРВИ и сопровождающихся ринитом;

— острых и рецидивирующих форм Herpes simplex экстрагенитальной и генитальной локализации;

— опоясывающего герпеса, ветряной оспы;

— цитомегаловирусной инфекции.

Относится к болезням:

- Ветрянка
- Герпес
- Грипп
- Инфекции
- Ринит
- Цитомегаловирусная инфекция

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают в возможно более ранние сроки заболевания.

При *гриппе, аденовирусной, респираторно-синцитиальной или при других вирусных инфекциях верхних отделов дыхательных путей* **взрослым** назначают по 1 таб. 4-6 раз/сут, **детям старше 12 лет** - по 1 таб. 3-4 раза/сут, **детям 3-12 лет** - по 1/2-1 таб. 2-4 раза/сут.

Для санации полости рта таблетки сублингвальные следует держать во рту до полного рассасывания.

Длительность лечения при гриппе - не менее 3 дней, при парагриппе, респираторно-синцитиальных инфекциях, аденовирусных, микст-инфекциях или других ОРВИ - не менее 5 дней.

При *ветряной оспе, опоясывающем лишае, герпетической, цитомегаловирусной инфекции, а также при других вирусных поражениях кожных покровов и слизистых оболочек* **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. 4-6 раз/сут, **детям старше 6-12 лет** - по 1 таб. 3-4 раза/сут, **детям 3-6 лет** - по 1/2 таб. 2-4 раза/сут.

Длительность лечения зависит от тяжести заболевания: при легком течении - 3-10 дней, при тяжелом и рецидивирующем течении - 2-3 недели. Целесообразно проведение повторных курсов лечения.

Для *профилактики герпетических и цитомегаловирусных инфекций* при иммуносупрессивной терапии, у послеоперационных больных препарат назначают по 1 таб. 3 раза/сут в течение 5-7 дней.

Побочное действие:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно повышение свертываемости крови.

Передозировка:

При использовании препарата Гипорамин не сообщалось о случаях передозировки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата Гипорамин при беременности и в период грудного вскармливания не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гипорамин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка сублингвальная содержит 529.9 мг сахарозы.

Использование в педиатрии

Таблетки сублингвальные не показаны к применению у **детей младше 3 лет**.

Применение в детском возрасте

Таблетки сублингвальные не показаны к применению у **детей младше 3 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Giporamin_tabletki