

Гипоролам



Код АТХ:

- [A13A](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь спиртовой	100 мл
экстракт густой слоевищ ламинарии	1 мг
(в пересчете на хлорофилл)	
сухой экстракт плодов облепихи крушиновидной	167 мг

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла (50) - коробки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (40) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено биологической активностью входящих в его состав компонентов. Повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам (в частности, к гипоксии), при физическом и умственном переутомлении.

Показания к применению:

- астенические состояния;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- повышенные физические и умственные нагрузки (в составе комплексной терапии у взрослых).

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к йоду;
- нефрит;
- почечная недостаточность;
- геморрагический диатез;
- заболевания щитовидной железы;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга;
- заболевания печени;
- гипервитаминоз А;
- беременность, период кормления грудью;
- возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, взрослым по 1 чайной ложке (предварительно развести в 50 мл воды) 1 раз в сутки (утром) после еды. Курс лечения - 2 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторного курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

В составе препарата содержится не менее 90% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (5 мл) содержится около 4,5 г абсолютного спирта.

При одновременном применении Гипоролама с поливитаминными препаратами следует учитывать содержание в его составе каротиноидов во избежание возможной передозировки. В 1 чайной ложке (5 мл) Гипоролама содержится не менее 0,04 мг суммы каротиноидов в пересчете на бета-каротин.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при почечной недостаточности и при нефрите.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Giporolam>