Гипозоль



Код АТХ:

- D08AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метилурацил
- Облепихи масло
- Сульфаэтидол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Аэрозоль для местного применения*** при выходе из баллона образует пену желто-оранжевого цвета.

	100 г
масло облепиховое	26.316 г
сульфаэтидол	1.754 г
диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил)	1.754 г

57 г - баллоны аэрозольные с клапаном непрерывного действия (1) в комплекте с насадкой-распылителем для интравагинального введения и предохранительным колпачком - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое действия, стимулирует регенеративные процессы.

Показания к применению:

— неспецифический вульвит, кольпит, эрозия шейки матки;

— состояние после экстирпации матки, состояние после диатермокоагуляции шейки матки;

— проктит, состояние после операций на прямой кишке и промежности;

— эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта и пародонта;

— ожоги II-III степени.

Относится к болезням:

- Вульвит
- Диатез
- Кольпит
- Кольпит
- Ожоги
- Пародонтит
- Эрозия шейки матки

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость;

— избыточность грануляций в предполагаемом месте нанесения препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. Наносят на пораженный участок. Перед применением аэрозольный баллон 10-15 раз встряхивают. Снимают предохранительный колпачок, на шток клапана надевают насадку, подводят к пораженному участку и плавно нажимают на головку насадки. При нажатии до упора за 1 с из баллона выделяется 7 мл пены.

При *гинекологических заболеваниях* наносят в течение 1-2 с. При вульвитах и кольпитах процедуру повторяют 1-2 раза в сутки, при эрозиях шейки матки - 2 раза в сутки. Курс - от 8 до 30 дней. Перед введением во влагалище с целью удаления слизи проводят спринцевание отваром ромашки, череды или раствором нитрофурала 1:5000, хлоргексидина биглюконата 0,02 %, натрия гидрокарбоната 2 %.

При *проктитах и проктосигмоидитах* вначале делают очистительную клизму с-отваром ромашки или календулы, после чего в прямую кишку вводят пену в дозе 14-28 мл. Курс лечения - 2-3 нед.

При *заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта* пеной покрывают пораженный участок на 10-15 мин от 3 до 5 раз в сутки. Курс лечения -1-2 нед.

При открытом способе лечения *ожогов* перед применением раневую поверхность очищают от экссудата и некротических тканей. Пену наносят равномерным слоем толщиной 1-1,5 см 1-2 раза в сутки.

При лечении *ран небольшого размера* наносят на стерильную салфетку и закрывают раневую поверхность. Продолжительность лечения определяется скоростью эпителизации ран. Перед каждым применением насадку баллона необходимо промыть кипяченой водой или прокипятить в течение 5 мин.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Передозировка препарата может вызвать аллергические реакции

Применение при беременности и кормлении грудью:

Информация о любом неблагоприятном влиянии препарата при лечении в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. При назначении следует оценить ожидаемую пользу для матери и возможный риск для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Можно совмещать с пероральным приемом антибактериальных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Информация о неблагоприятном влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не зарегистрирована.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 20°С, вдали от источника огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gipozol