

Гирель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания гомеопатические** белого или желтовато-белого цвета, иногда с желтыми или черными вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; запах практически отсутствует.

	1 таб.
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D4	120 мг
Bryonia (бриония) D4	60 мг
Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис мутус (лахезис)) D12	60 мг
Eupatorium perfoliatum (эупаториум перфолиатум) D3	30 мг
Phosphorus (фосфорус) D5	30 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в качестве симптоматического средства при острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение температуры, потеря аппетита, слабость).

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день. **Дети в возрасте от 6 до 12 лет** принимают по 1 таблетке 2 раза в день.

Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

При *остром начале заболевания* принимать по 1 таблетке каждые полчаса или час, но не более 12 таблеток в день - для **взрослых и детей старше 12 лет**; не более 8 таблеток в день для **детей от 6 до 12 лет**.

Если в течение 6 часов не происходит улучшения состояния больного, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прервать прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0.025 ХЕ.

Беречь от влаги! Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с

движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано применение препарата у детей в возрасте до 6 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Girel>