

## Гистохром



### Код АТХ:

- [S03D](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пентагидроксиэтилнафтохинон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Раствор для инъекций 0.02%</b> | <b>1 мл</b> |
| пентагидроксиэтилнафтохинон       | 200 мкг     |

1 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

1 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

1 мл - ампулы темного стекла (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Гистохром относится к антиоксидантным препаратам. Механизм действия связан со способностью гистохрома стабилизировать клеточные мембраны, взаимодействовать с активными формами кислорода, свободными радикалами, проявлять свойства хелатора металлов переменной валентности. Гистохром снижает количество продуктов перекисного окисления липидов.

### Показания к применению:

Взрослым в составе комплексной терапии при следующих офтальмопатологиях:

- дистрофические заболевания сетчатки и роговицы, макулярная дегенерация;
- первичная открытоугольная глаукома;

- диабетическая ретинопатия сетчатки;
- кровоизлияние в стекловидное тело, сетчатку, переднюю камеру;
- дисциркуляторное нарушение в центральной артерии и вене сетчатки.

**Относится к болезням:**

- [Глаукома](#)
- [Ретинопатия](#)

**Противопоказания:**

- индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы:**

В виде субконъюнктивальных и парабульбарных инъекций по 0,3-0,5 мл раствора 0,2 мг/мл ежедневно или через день. Курс лечения 5-10 инъекций. При необходимости курс лечения повторяют через 3-4 месяца.

**Побочное действие:**

Возможна умеренная болезненность после инъекции в месте укола, а также местные аллергические реакции.

**Передозировка:**

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения при беременности и в период лактации не установлена, поэтому препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не допускается при введении смешивать Гистохром с препаратами, содержащими белки, соли кальция, железа.

**Особые указания и меры предосторожности:*****Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 18 лет.

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gistohrom>