Гистохром

Код АТХ:

- S03D

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пентагидроксиэтилнафтохинон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для инъекций 0.02%	**1 мл**
пентагидроксиэтилнафтохинон	200 мкг

1 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
1 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
1 мл - ампулы темного стекла (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гистохром относится к антиоксидантным препаратам. Механизм действия связан со способностью гистохрома стабилизировать клеточные мембраны, взаимодействовать с активными формами кислорода, свободными радикалами, проявлять свойства хелатора металлов переменной валентности. Гистохром снижает количество продуктов перскисного окисления липидов.

Показания к применению:

Взрослым в составе комплексной терапии при следующих офтальмопатологиях:

— дистрофические заболевания сетчатки и роговицы, макулярная дегенерация;

— первичная открытоугольная глаукома;

— диабетическая ретинопатия сетчатки;

— кровоизлияние в стекловидное тело, сетчатку, переднюю камеру;

— дисциркуляторное нарушение в центральной артерии и вене сетчатки.

Относится к болезням:

- Глаукома
- Ретинопатия

Противопоказания:

— индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

В виде субконъюнктивальных и парабульбарных инъекций по 0,3-0,5 мл раствора 0,2 мг/мл ежедневно или через день. Курс лечения 5-10 инъекций. При необходимости курс лечения повторяют через 3-4 месяца.

Побочное действие:

Возможна умеренная болезненность после инъекции в месте укола, а также местные аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения при беременности и в период лактации не установлена, поэтому препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не допускается при введении смешивать Гистохром с препаратами, содержащими белки, соли кальция, железа.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gistohrom