Гитагамп



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Прочие препараты

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** желатиновые, №0, желтого цвета; содержимое капсул - порошок желтого или оранжево-желтого цвета с белыми вкраплениями и характерным запахом.

	1 капс.
тиамина хлорид (вит. B_1)	25 мг
рибофлавин (вит. B_2)	25 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	25 мг
пиридоксин (вит. B_6)	25 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	50 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	25 мкг
никотиновая кислота (вит. PP)	25 мг
никотиноил гамма-аминомасляной кислоты натриевая соль	50 мг

Вспомогательные вещества: поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, крахмал картофельный, сахар.

50 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат метаболической терапии.

Гитагамп обладает антигипоксическими и антиоксидантными свойствами, улучшает кровоснабжение и функциональное состояние головного мозга, благоприятно влияет на его метаболизм. Гитагамп улучшает микроциркуляцию и способствует улучшению кровоснабжения внутренних органов. Комплекс витаминов, входящих в состав препарата, способствует нормализации обмена веществ.

Фармакокинетика

Гитагамп быстро всасывается из ЖКТ, распределяется в головном мозге, в почках, мышцах и жировой ткани.

Показания к применению:

— снижение физической и умственной работоспособности;

— переутомление;

— повышенная физическая или психическая нагрузка;

— в составе комплексной терапии при хронических формах недостаточности мозгового кровообращения;

— в составе комплексной терапии при хроническом алкоголизме (уменьшает астенические, астеноневротические, астенодепрессивные состояния);

— лечение алкогольной энцефалопатии;

— в составе комплексной терапии для уменьшения экстрапирамидных расстройств, возникающих при приеме антипсихотических средств (нейролептиков).

Относится к болезням:

- Алкоголизм
- Алкогольная энцефалопатия
- Астения
- Астенодепрессивные состояния
- Энцефалит

Противопоказания:

— выраженные нарушения функции почек;

— беременность;

— период лактации;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Гитагамп следует принимать внутрь после приема пищи утром и днем не позднее 17 ч.

В *комплексной терапии алкоголизма* Гитагамп применяют по 1-3 капс./сут в течение всего периода лечения.

Для *восстановления работоспособности*, а также при *астенических состояниях* Гитагамп применяют по 1 капс./сут.

При *экстрапирамидных расстройствах* препарат назначают по 1 капс. 1 раз/сут.

По остальным показаниям препарат применяют по 1 капс./сут.

Продолжительность курса лечения, увеличение суточной дозы препарата - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.

Прочие: редко - головокружение, головная боль, легкая тошнота (следует уменьшить дозу или отменить препарат).

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Препарат не рекомендуется назначать при остром нарушении мозгового кровообращения.

Возможно совершенно безвредное окрашивание мочи в желтый цвет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Следует соблюдать осторожность при работе с механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при выраженных нарушениях функции почек.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gitagamp