

Гитерна



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки вагинальные круглые, плоскоцилиндрические, светло-желтого или желтого цвета, мраморные, со специфическим запахом.

	1 таб.
метронидазол	500 мг
неомицина сульфат	65 тыс.МЕ
нистатин	100 тыс.МЕ
преднизолон (в форме натрия фосфата)	3 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, поливинилпирролидон (повидон), кремния диоксид коллоидный (аэросил), тальк, магния стеарат, полипласдон ИКС ЭЛ-10 (кросповидон), ароматическая композиция с шоколадным запахом.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с противопротозойным, антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Оказывает также противовоспалительное действие; обеспечивает целостность слизистой оболочки влагалища и постоянство pH.

Метронидазол (производное нитроимидазола) - противопротозойное средство, ингибирует синтез нуклеиновых кислот в ДНК клеток микроорганизмов. *Активен в отношении* *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., а также в отношении *облигатных анаэробов*: *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp.

Неомицина сульфат является антибиотиком широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно. *Активен в отношении грамположительных* (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и *грамотрицательных* (*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus* spp.) микроорганизмов.

Нистатин *активен в отношении* дрожжеподобных грибов рода *Candida*, изменяет проницаемость клеточных мембран и замедляет их рост.

Преднизолон - глюкокортикостероид, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное действие.

Состав наполнителя позволяет обеспечить постоянство pH.

Фармакокинетика

Данных по фармакокинетики препарата Гитерна не предоставлены.

Показания к применению:

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в т.ч.:

- бактериальный вагинит;
- трихомоноз влагалища;
- вагинит, вызванный грибами рода *Candida*;
- смешанный вагинит.

Профилактика вагинитов, в т.ч.:

- перед гинекологическими операциями;
- перед родами и абортом;
- до и после установки внутриматочных средств;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед гистерографией.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Диатез](#)
- [Трихомоноз](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

1 вагинальную таблетку вводят 1 раз/сут (перед сном) глубоко во влагалище в положении лежа. Перед введением во влагалище таблетку следует намочить в воде в течение 20-30 с. После введения необходимо находиться в горизонтальном положении в течении 10-15 мин.

Средняя продолжительность лечения - 10 дней; в случае подтвержденного микоза может быть увеличена до 20 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: чувство жжения, зуд, гиперемия слизистой оболочки влагалища (особенно в начале лечения).

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Гитерна не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случае, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода или младенца.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Гитерна с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата при вагинитах и трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.

Не следует прекращать применение препарата во время менструации.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Не следует применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Giterna>