

Глаксенна



Код АТХ:

- [A06AB06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сеннозиды А и В](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с вкраплениями, с выдавленной надписью "Glaxenna" на одной стороне и разделительной риской - на другой.

	1 таб.
сеннозиды А и В (в форме кальциевых солей)	13.5 мг

10 шт. - стрипы (1) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительный препарат растительного происхождения. Стимулирует перистальтику кишечника, что обусловлено воздействием на рецепторы толстой кишки. Слабительный эффект развивается через 6-12 ч после приема препарата.

Показания к применению:

- запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки;
- регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- спастический запор;
- кишечная непроходимость;
- боли в животе неясного генеза;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- маточные кровотечения;
- цистит;
- нарушения водно-электролитного баланса;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Правильно подобранная доза препарата обеспечивает регулярную дефекацию мягким стулом (эта доза подбирается индивидуально).

Для **взрослых** начальная доза составляет 1 таб./сут, в дальнейшем проводят подбор дозы в диапазоне от 1/2 до 2 таб./сут.

Детям старше 12 лет препарат назначают в начальной дозе 1/2 таб. и при необходимости увеличивают до 1-2 таб./сут.

В процессе подбора дозы рекомендуют принимать препарат в одной и той же дозе в течение нескольких дней и увеличивать ее на 1/2 таб. Пациента следует предупредить, что если после достижения максимальной дозы в течение 3 дней дефекация не происходит, следует обратиться к врачу.

Таблетки принимают 1 раз/сут, перед сном, запивая водой.

Побочное действие:

Возможно: схваткообразные боли в животе, метеоризм.

При длительном применении (особенно в высоких дозах): потеря электролитов (преимущественно калия) с калом, альбуминурия, гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание мочи, кожная сыпь, судороги, сосудистый коллапс.

Передозировка:

При передозировке препарата возможно усиление описанных побочных эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью назначают препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При длительном применении препарата в высоких дозах возможно усиление эффектов одновременно применяемых сердечных гликозидов, а также влияние на эффекты антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, ГКС, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью назначают препарат при заболеваниях печени и/или почек.

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.

После приема Глаксенны возможно окрашивание мочи: при кислой реакции мочи - в желтовато-коричневый цвет; при щелочной - в красноватый.

При нарушениях функции почек

С осторожностью назначают препарат при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью назначают препарат при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Детям старше 12 лет препарат назначают в начальной дозе 1/2 таб. и при необходимости увеличивают до 1-2 таб./сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Glaksenna>