

## [Глауцин \(сироп\)](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противокашлевое средство центрального действия. Алкалоид растения Мачек желтый (*Glaucium flavum*). В отличие от кодеина не угнетает дыхательный центр, не подавляет двигательную активность кишечника; при длительном применении не вызывает лекарственной зависимости и привыкания. Обладает аденолитическими свойствами, может вызвать понижение АД.

### **Показания к применению:**

Кашель различной этиологии, в т.ч. при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, бронхов и легких, при бронхиальной астме, плеврите, коклюше, туберкулезе и раке легких.

### **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Инфекции](#)
- [Коклюш](#)
- [Плеврит](#)
- [Рак](#)
- [Туберкулез](#)

### **Противопоказания:**

Артериальная гипотензия, инфаркт миокарда, гиперчувствительность, гиперпродукция мокроты.

### **Способ применения и дозы:**

Для взрослых разовая доза составляет 40 мг, частота приема - 2-3 раза/сут. Для подавления ночного кашля в тяжелых случаях - 80 мг на ночь. Максимальная суточная доза 200 мг. Для детей старше 4 лет разовая доза - 10 мг, частота приема - 2-3 раза/сут. Рекомендуется принимать после еды.

## **Побочное действие:**

*Редко:* при применении разовой дозы 80 мг возможны головокружение, слабость, тошнота, снижение АД, аллергические реакции.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Может быть использован в комбинации с эфедрина гидрохлоридом, лимонной кислотой, маслом базилика янтарного.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 4 лет.

### ***Применение в детском возрасте***

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 4 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Glaucin\\_sirop](http://drugs.thead.ru/Glaucin_sirop)