Глауцин (сироп)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противокашлевое средство центрального действия. Алкалоид растения Мачек желтый (Glaucium flavum). В отличие от кодеина не угнетает дыхательный центр, не подавляет двигательную активность кишечника; при длительном применении не вызывает лекарственной зависимости и привыкания. Обладает адренолитическими свойствами, может вызвать понижение АД.

Показания к применению:

Кашель различной этиологии, в т.ч. при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, бронхов и легких, при бронхиальной астме, плеврите, коклюше, туберкулезе и раке легких.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Инфекции
- Коклюш
- Плеврит
- Рак
- Туберкулез

Противопоказания:

Артериальная гипотензия, инфаркт миокарда, гиперчувствительность, гиперпродукция мокроты.

Способ применения и дозы:

Для взрослых разовая доза составляет 40 мг, частота приема - 2-3 раза/сут. Для подавления ночного кашля в тяжелых случаях - 80 мг на ночь. Максимальная суточная доза 200 мг. Для детей старше 4 лет разовая доза - 10 мг, частота приема - 2-3 раза/сут. Рекомендуется принимать после еды.

Побочное действие:

Редко: при применении разовой дозы 80 мг возможны головокружение, слабость, тошнота, снижение АД, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Может быть использован в комбинации с эфедрина гидрохлоридом, лимонной кислотой, маслом базилика янтарного.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 4 лет.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 4 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Glaucin_sirop