

## Глекомен



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Раствор для внутриглазного введения** прозрачный, бесцветный.

	<b>1 мл</b>
гепарин натрия (с активностью 120 МЕ/мг)	0.4 мг
глюкозаминогликаны сульфатированные	0.05 мг
меди сульфата пентагидрат	0.0038 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная - до 1 мл.

0.5 мл - ампулы (4) - пачки картонные.

0.5 мл - флаконы (4) - пачки картонные.

1 мл - ампулы (4) - пачки картонные.

1 мл - флаконы (4) - пачки картонные.

2 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Глекомен стимулирует пролиферацию эндотелия роговицы, нормализует водный и солевой обмен ее стромы, оказывает ингибирующее влияние на протеолитические ферменты.

### Показания к применению:

- различные оперативные вмешательства на роговице;
- проведение экстракции катаракты с (без) имплантацией искусственной интраокулярной линзы;
- обработка проникающих ранений роговицы;
- лечение послеоперационной кератопатии и начальной стадии эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы.

### Относится к болезням:

- [Катаракта](#)
- [Кератит](#)

### **Противопоказания:**

- сахарный диабет;
- злокачественные новообразования;
- рецидивирующие внутриглазные кровоизлияния;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

*Для снижения потери эндотелиальных клеток по завершении оперативного вмешательства на роговице, обработки проникающего ранения роговицы, а так же экстракции катаракты 0,2 мл Глекомена вводят в переднюю камеру глаза или 0,3 мл Глекомена вводят субконъюнктивально сразу после операции и далее ежедневно в течение 3 дней*

*Для лечения кератопатии и эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы препарат вводят субконъюнктивально по 0,3 мл ежедневно в течение 5-8 дней или методом фонофореза с помощью прибора УЗТ-307 в непрерывном режиме при интенсивности 0,2-0,3 Вт/см<sup>2</sup>. Длительность сеанса 10 минут. Для проведения одного сеанса используют 5,0 мл Глекомена соответственно объему ванночки для фонофореза. Курс лечения включает 5 сеансов, которые проводятся ежедневно.*

При необходимости курс лечения препаратом Глекомен можно повторить через 1,5-2 месяца.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При нарушении свертывании крови могут наблюдаться внутриглазные кровоизлияния.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от +4°C до +10°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Glekomen>