Глекомен



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для внутриглазного введения прозрачный, бесцветный.

	1 мл
гепарин натрия (с активностью 120 МЕ/мг)	0.4 мг
глюкозаминогликаны сульфатированные	0.05 мг
меди сульфата пентагидрат	0.0038 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная - до 1 мл.

0.5 мл - ампулы (4) - пачки картонные.
0.5 мл - флаконы (4) - пачки картонные.
1 мл - ампулы (4) - пачки картонные.
1 мл - флаконы (4) - пачки картонные.
2 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Глекомен стимулирует пролиферацию эндотелия роговицы, нормализует водный и солевой обмен ее стромы, оказывает ингибирующее влияние на протеолитические ферменты.

Показания к применению:

— различные оперативные вмешательства на роговице;

— проведение экстракции катаракты с (без) имплантацией искусственной интраокулярной линзы;

— обработка проникающих ранений роговицы;

— лечение послеоперационной кератопатии и начальной стадии эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы.

Относится к болезням:

- Катаракта
- Кератит

Противопоказания:

— сахарный диабет;

— злокачественные новообразования;

— рецидивирующие внутриглазные кровоизлияния;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для *снижения потери эндотелиальных клеток по завершении оперативного вмешательства на роговице, обработки проникающего ранения роговицы, а так же экстракции катаракты* 0,2 мл Глекомена вводят в переднюю камеру глаза или 0,3 мл Глекомена вводят субконъюнктивально сразу после операции и далее ежедневно в течение 3 дней

Для *лечения кератопатии и эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы* препарат вводят субконъюнктивально по 0,3 мл ежедневно в течение 5-8 дней или методом фонофореза с помощью прибора УЗТ-307 в непрерывном режиме при интенсивности 0,2-0,3 вт/см^2. Длительность сеанса 10 минут. Для проведения одного сеанса используют 5,0 мл Глекомена соответственно объему ванночки для фонофореза. Курс лечения включает 5 сеансов, которые проводятся ежедневно.

При необходимости курс лечения препаратом Глекомен можно повторить через 1,5-2 месяца.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При нарушении свертывании крови могут наблюдаться внутриглазные кровоизлияния.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от +4°С до +10°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Glekomen