

## [Глицелакс](#)



### **Код АТХ:**

- [A06AX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Глицерол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Слабительное средство для местного применения. Оказывает легкое раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки и рефлекторно стимулирует перистальтику. Способствует размягчению каловых масс.

При наружном применении оказывает дерматопротекторное действие, смягчает кожу и слизистые оболочки.

### **Показания к применению:**

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности).

Сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения).

## **Противопоказания:**

Геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки; повышенная чувствительность к глицеролу.

## **Способ применения и дозы:**

Ректально - 1 раз/сут, желательно через 15-20 мин после завтрака.

Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости.

## **Побочное действие:**

При *длительном наружном применении*: раздражение, аллергические реакции.

При *длительном ректальном применении*: явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение глицерола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Систематический прием не рекомендуется. При применении в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Glicelaks>