# Глицериновые суппозитории



## Код АТХ:

- A06AG04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глицерол

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Слабительное средство для местного применения. Оказывает легкое раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки и рефлекторно стимулирует перистальтику. Способствует размягчению каловых масс.

При наружном применении оказывает дерматопротекторное действие, смягчает кожу и слизистые оболочки.

## Показания к применению:

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности).

Сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения).

## Противопоказания:

Геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки; повышенная чувствительность к глицеролу.

## Способ применения и дозы:

Ректально - 1 раз/сут, желательно через 15-20 мин после завтрака.

Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости.

## Побочное действие:

При *длительном наружном применении:* раздражение, аллергические реакции.

При *длительном ректальном применении:* явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение глицерола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

## Особые указания и меры предосторожности:

Систематический прием не рекомендуется. При применении в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Glicerinovye_Suppozitorii