

[Глицериновые суппозитории](#)



Код АТХ:

- [A06AG04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Глицерол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство для местного применения. Оказывает легкое раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки и рефлекторно стимулирует перистальтику. Способствует размягчению каловых масс.

При наружном применении оказывает дерматопротекторное действие, смягчает кожу и слизистые оболочки.

Показания к применению:

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности).

Сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения).

Противопоказания:

Геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки; повышенная чувствительность к глицеролу.

Способ применения и дозы:

Глицериновые суппозитории

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Ректально - 1 раз/сут, желательно через 15-20 мин после завтрака.

Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости.

Побочное действие:

При *длительном наружном применении*: раздражение, аллергические реакции.

При *длительном ректальном применении*: явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение глицерола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Особые указания и меры предосторожности:

Систематический прием не рекомендуется. При применении в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Источник: http://drugs.thead.ru/Glicerinovye_suppozitorii