Глицифон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 30% от желто-бурого до зеленовато-бурого цвета, со специфическим запахом.

	10 г
ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир метилфосфоновой кислоты (глицифон)	3 г

Вспомогательные вещества: вазелин медицинский, ланолин безводный.

10 г - банки темного стекла.
10 г - тубы алюминиевые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоопухолевый препарат. Проявляет действие при контакте с опухолями или предопухолевыми заболеваниями кожи. Избирательно угнетает метаболизм в бластоматозно измененных клетках, что объясняется антимитотическим действием, особенно выраженным в кислой среде опухолевой ткани.

Оказывает противомикробное действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Глицифон не предоставлены.

Показания к применению:

— плоскоклеточный рак кожи I стадии;

— базалиомы (в т.ч. рецидивы после хирургического лечения или лучевой терапии);

— болезнь Бовена;

— сенильный кератоз.

Относится к болезням:

- Базалиома
- Кератит

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— острая сердечно-сосудистая недостаточность;

— эпилептиформные расстройства;

— состояние тревоги или возбуждения;

— бессонница;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Кожу в зоне роста опухоли или кератоза протирают тампоном, смоченным в спирте, затем накладывают 0.8-2 г мази (в зависимости от размера очага) под марлевую салфетку и фиксируют пластырем. При каждой перевязке очаг и окружающую кожу протирают спиртом и удаляют некротизированную ткань. Аппликации делают ежедневно 1 раз/сут до полного разрушения опухолевой ткани.

Продолжительность лечения определяется локализацией и размерами очага. При лечении *рецидивирующих опухолей, мелкоузелковых форм базалиом* в области лба и носа назначают 15-20 аппликаций, при *язвенных формах, при базалиомах поверхностного типа и болезни Бовена* - 10-15 аппликаций, при *сенильных кератозах* - 5-10 аппликаций.

После завершения лечения Глицифоном на образовавшийся дефект кожи накладывают асептические повязки или повязки с антисептическими мазями до полного рубцевания.

Побочное действие:

Возможно: отек (в т.ч. отек периорбитальной области), гиперемия. В этих случаях рекомендуется прервать лечение на 2-3 дня и назначить примочки с растворами нитрофурана или мазь с ГКС, после перерыва лечение следует продолжить.

Местные реакции: боль в месте нанесения препарата. Для уменьшения болезненности можно одновременно накладывать на очаг 5-10% мазь с бензокаином.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Глицифон не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Глицифон не описано.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Glicifon