

## Глицифон



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь для наружного применения 30%** от желто-бурого до зеленовато-бурого цвета, со специфическим запахом.

	<b>10 г</b>
ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир метилфосфоновой кислоты (глицифон)	3 г

*Вспомогательные вещества:* вазелин медицинский, ланолин безводный.

10 г - банки темного стекла.

10 г - тубы алюминиевые.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противоопухолевый препарат. Проявляет действие при контакте с опухолями или предопухолевыми заболеваниями кожи. Избирательно угнетает метаболизм в бластоматозно измененных клетках, что объясняется антимитотическим действием, особенно выраженным в кислой среде опухолевой ткани.

Оказывает противомикробное действие.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Глицифон не предоставлены.

### Показания к применению:

- плоскоклеточный рак кожи I стадии;
- базалиомы (в т.ч. рецидивы после хирургического лечения или лучевой терапии);
- болезнь Бовена;
- сенильный кератоз.

### Относится к болезням:

- [Базалиома](#)
- [Кератит](#)

### Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- острая сердечно-сосудистая недостаточность;
- эпилептиформные расстройства;
- состояние тревоги или возбуждения;
- бессонница;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания).

### Способ применения и дозы:

Кожу в зоне роста опухоли или кератоза протирают тампоном, смоченным в спирте, затем накладывают 0.8-2 г мази (в зависимости от размера очага) под марлевую салфетку и фиксируют пластырем. При каждой перевязке очаг и окружающую кожу протирают спиртом и удаляют некротизированную ткань. Аппликации делают ежедневно 1 раз/сут до полного разрушения опухолевой ткани.

Продолжительность лечения определяется локализацией и размерами очага. При лечении *рецидивирующих опухолей, мелкоузловых форм базалиом* в области лба и носа назначают 15-20 аппликаций, при *язвенных формах, при базалиомах поверхностного типа и болезни Бовена* - 10-15 аппликаций, при *сенильных кератозах* - 5-10 аппликаций.

После завершения лечения Глицифоном на образовавшийся дефект кожи накладывают асептические повязки или повязки с антисептическими мазями до полного рубцевания.

### Побочное действие:

*Возможно:* отек (в т.ч. отек периорбитальной области), гиперемия. В этих случаях рекомендуется прервать лечение на 2-3 дня и назначить примочки с растворами нитрофурана или мазь с ГКС, после перерыва лечение следует продолжить.

*Местные реакции:* боль в месте нанесения препарата. Для уменьшения болезненности можно одновременно накладывать на очаг 5-10% мазь с бензокаином.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата Глицифон не предоставлены.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Глицифон не описано.

### Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Glicifon>