

[Глицирам](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аммония глицирризинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает противовоспалительное, умеренное отхаркивающее, послабляющее и спазмолитическое действие, стимулирует функцию коры надпочечников.

Показания к применению:

- в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. при бронхиальной астме);
- в качестве слабительного средства у лиц с повышенной кислотностью желудка;
- экзема, аллергический дерматит;
- астенические состояния;
- артериальная гипотензия;
- болезнь Аддисона (диэнцефально-гипофизарные формы, в виде монотерапии и в сочетании с АКТГ);
- надпочечниковая недостаточность (на фоне длительной терапии ГКС), в т.ч. профилактика синдрома отмены в период прекращения лечения ГКС или снижения их дозировки.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Гипотензия](#)
- [Дерматит](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- тяжелые органические поражения сердца;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- повышенная чувствительность к аммония глицирризинату.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь через 30 мин после еды, по 25 мг (содержимое 1 пакета однодозовой упаковки растворяют в 20 мл теплой кипяченой воды).

Детям от 5 мес до 3 лет - 2 раза/сут, от **3-5 лет** - 3 раза/сут, от **5-10 лет** - 3-4 раза/сут. Курс лечения - от 3 до 30 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gliciram>