Глицирам (гранулы)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аммония глицирризинат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает противовоспалительное, умеренное отхаркивающее, послабляющее и спазмолитическое действие, стимулирует функцию коры надпочечников.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. при бронхиальной астме);

— в качестве слабительного средства у лиц с повышенной кислотностью желудка;

— экзема, аллергический дерматит;

— астенические состояния;

— артериальная гипотензия;

— болезнь Аддисона (диэнцефально-гипофизарные формы, в виде монотерапии и в сочетании с АКТГ);

— надпочечниковая недостаточность (на фоне длительной терапии ГКС), в т.ч. профилактика синдрома отмены в период прекращения лечения ГКС или снижения их дозировки.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Астенические состояния
- Астения
- Гипотензия
- Дерматит
- Экзема

Противопоказания:

— тяжелые органические поражения сердца;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— повышенная чувствительность к аммония глицирризинату.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь через 30 мин после еды, по 25 мг (содержимое 1 пакета однодозовой упаковки растворяют в 20 мл теплой кипяченой воды).

Детям от 5 мес до 3 лет - 2 раза/сут, от **3-5 лет** - 3 раза/сут, от **5-10 лет** - 3-4 раза/сут. Курс лечения - от 3 до 30 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gliciram_granuly