

## Глутаргин алкоклин



### Код АТХ:

- [A05BA01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аргинина глутамат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки</b>	<b>1 таб.</b>
аргинина глутамат	1 г

2 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Глутаргин алкоклин является соединением аргинина и глутаминовой кислоты, которые играют важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотистых веществ - аммиака. Оказывает гепатопротекторное действие, обладая антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активностью, позитивно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.

При алкогольной интоксикации Глутаргин алкоклин стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола - алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на ЦНС за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты.

Глутаргин алкоклин не оказывает эмбриотоксических, гонадотоксических и мутагенных эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.

## Показания к применению:

Профилактика опьянения и гепатотоксического действия алкоголя. Лечение острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления тяжелой степени.

## Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- период беременности и кормление грудью.

*С осторожностью*

- лихорадочное состояние;
- повышенная возбудимость;
- тяжелые нарушения фильтрационной (азотовыделительной) функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин)

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают взрослым внутрь независимо от приема пищи.

Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя назначают по 2 таблетки (2 г) за 1-2 ч до приема алкоголя или 1 таблетку (1 г) за 1 ч до приема алкоголя и 1 таблетку (1 г) в течение 0.5 ч после приема алкоголя.

Для лечения острой алкогольной интоксикации легкой и средней тяжести назначают по 1 таблетке (1 г) 4 раза в день с интервалами 1-2.5 ч, в последующие 2-3 дня - по 1 таблетке 2 раза в сут. При алкогольном отравлении тяжелой степени, после курса в/в применения препарата Глутаргин, назначают по 1 таблетке (1 г) Глутаргина алкоклина 2 раза в сут в течение 20 дней в составе комплексной терапии.

## Побочное действие:

Редко могут наблюдаться чувство легкого дискомфорта в эпигастральной области и тошнота непосредственно после применения препарата, которые проходят самостоятельно.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, боль в области грудной клетки, чувство дискомфорта в эпигастральной области, бессонница, преходящее кратковременное снижение артериального давления, атриовентрикулярная блокада, аллергические реакции.

*Лечение:* симптоматическое, при необходимости прием антигистаминных средств, в тяжелых случаях - в/в введение глюкокортикостероидов.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: период беременности и кормление грудью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

*Следует соблюдать осторожность при сочетании препарата Глутаргин со следующими лекарственными средствами:*

— аминофиллин повышает концентрацию эндогенного инсулина в крови под влиянием Глутаргина алкоклина. Глутаргин алкоклин может усиливать эффект антиагрегантных средств (дипиридамол и др.), предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникать при терапии изониазидом, ослабляет эффект винбластина.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При назначении пациентам с нарушениями функций эндокринных желез следует учитывать, что препарат может незначительно увеличивать секрецию инсулина и гормона роста, что не требует коррекции медикаментозной терапии у пациентов с сахарным диабетом и/или акромегалией.

*Влияние препарата на способность управления транспортными средствами.* Препарат не влияет на способность управления транспортными средствами.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью: тяжелые нарушения фильтрационной (азотовыделительной) функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин).

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан: детский возраст до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Glutargin\\_alkoklin](http://drugs.thead.ru/Glutargin_alkoklin)