Глюкозамина сульфат 750



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глюкозамин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** от светло-желтого до темно-желтого цвета, овальные, двояковыпуклые, с гравировкой "S 750" с одной стороны.

	1 таб.
Глюкозамина сульфат	750 мг

Вспомогательные вещества: кальция карбонат, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, натрия кроскармеллоза, гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, пропиленгликоль, Е110.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Глиюкозамин способствует предотвращению процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости.

Улучшает подвижность суставов, уменьшает потребность в НПВП.

Показания к применению:

— остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз

Противопоказания:

— фенилкетонурия;

— выраженное нарушение функции почек;

— беременность;

— период лактации;

—индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** по 1 таб. 2 раза/сут.

Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата в течение 6 месяцев.

Побочное действие:

Нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусиитетических пенициллинов. хлорамфеникола.

Препарат совместим с парацетамолом, НПВП и глюкокортикостероидами. При совместном применении с НПВП усиливает противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать детям до 15 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов.

Условия хранения:

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре 10-30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.