

[Глюкозамина сульфат 750](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Глюкозамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** от светло-желтого до темно-желтого цвета, овальные, двояковыпуклые, с гравировкой "S 750" с одной стороны.

	1 таб.
Глюкозамина сульфат	750 мг

Вспомогательные вещества: кальция карбонат, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, натрия кроскармеллоза, гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, пропиленгликоль, E110.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Глюкозамин способствует предотвращению процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости.

Улучшает подвижность суставов, уменьшает потребность в НПВП.

Показания к применению:

— остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Относится к болезням:

- [Остеoarтрит](#)
- [Остеoarтроз](#)

Противопоказания:

- фенилкетонурия;
- выраженное нарушение функции почек;
- беременность;
- период лактации;
- индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** по 1 таб. 2 раза/сут.

Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата в течение 6 месяцев.

Побочное действие:

Нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов. хлорамфеникола.

Препарат совместим с парацетамолом, НПВП и глюкокортикостероидами. При совместном применении с НПВП усиливает противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать детям до 15 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов.

Условия хранения:

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре 10-30°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Глюкозамина сульфат 750

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)
