

Гомеострес



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания гомеопатические** двояковыпуклой формы, белого цвета, круглые, с гравировкой "SEDATIF P.C." на одной стороне, без запаха или со слабым запахом.

	1 таб.
Aconitum napellus (аконитум напеллюс) С6	0.5 мг
Belladonna (белладонна) С6	0.5 мг
Calendula officinalis (календула официналис) С6	0.5 мг
Chelidonium majus (хелидонииум майюс) С6	0.5 мг
Lequirity (еквирити) С6	0.5 мг
Viburnum opulus (витрум опулюс) С6	0.5 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза, магния стеарат - до 300 мг.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гомеострес не предоставлены.

Показания к применению:

- тревожные расстройства;
- беспокойство;
- нарушения сна.

Относится к болезням:

- [Тревожное расстройство](#)

Противопоказания:

- тревожные расстройства тяжелой степени выраженности;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Медленно рассасывать по 2 таб. 3 раза/сут. Прием препарата не должен превышать 7 дней.

Детям в возрасте до 6 лет перед приемом следует растворить таблетки в воде.

Побочное действие:

На настоящий момент информация о побочных эффектах препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат применяется после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На настоящий момент взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечения другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо проконсультироваться с врачом, если на фоне приема препарата не отмечается никаких улучшений.

При наличии выявленной непереносимости фруктозы, сахарозы или галактозы, синдрома мальабсорбции глюкозы, галактозы или дефицита сахаразы/изомальтазы не следует принимать препарат по причине наличия в его составе сахарозы и лактозы.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая таблетка содержит менее 0.02 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Гомеострес

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте до 6 лет перед приемом следует растворить таблетки в воде. Противопоказан детям до 3 лет

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gomeostres>