

Гомеовокс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Таблетки гомеопатические**, покрытые оболочкой белого цвета, двояковыпуклой формы, без запаха.

	1 таб.
Aconitum napellus (аконитум напеллюс) С3	0.091 мг
Arum triphyllum (арум трифиллум) С3	0.091 мг
Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) С6	0.091 мг
Calendula officinalis (календула официналис) С6	0.091 мг
Spongia tosta (спонгия тоста) С6	0.091 мг
Belladonna (белладонна) С6	0.091 мг
Mercurius solubilis (меркуриус солюбус) С6	0.091 мг
Hepar sulphur (гепар сульфур) С6	0.091 мг
Kalium bichromicum (калиум бихромикум) С6	0.091 мг
Populus candicans (популюс кандиканс) С6	0.091 мг
Bryonia (бриония) С3	0.091 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза, крахмал, магния стеарат.

Состав оболочки: акации камедь, желатин, сахароза, тальк, воск пчелиный белый, воск карнаубский.

Масса таблетки 300 мг.

20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гомеовокс не предоставлены.

Показания к применению:

— ларингиты различной этиологии, в т.ч. потеря голоса, хрипота, усталость голосовых связок.

Относится к болезням:

- [Ларингит](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

В *лечебных целях* назначают по 2 таб. каждый час (не более 24 таб./сут), по мере улучшения состояния перейти на поддерживающую терапию - по 2 таб. 5 раз/сут.

В *профилактических целях*: по 2 таб. 5 раз/сут.

Рассасывать таблетки медленно в промежутках между приемами пищи.

Детям от 1 года до 6 лет перед приемом растворять таблетки в небольшом количестве воды.

Побочное действие:

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На настоящий момент информация о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствует.

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Режим дозирования и кратность приема не зависит от возраста.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в одной таблетке соответствует около 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

Детям от 1 года до 6 лет таблетки перед приемом следует растворить в жидкости.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gomeovoks>