Горца птичьего (Спорыша) трава



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Горца птичьего трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
трава горца птичьего	50 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой горца птичьего (спорыша) травы препятствует образованию мочевых камней (уратов). Оказывает диуретическое, противовоспалительное, гемостатическое, умеренное антимикробное действие, повышает сократительную активность матки.

Показания к применению:

Мочекаменная болезнь (в качестве средства, способствующего отхождению мелких конкрементов).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату; повышенная свертываемость крови, беременность, детский возраст до 12 лет. Наличие в мочевыводящих путях камней, размером более 6 мм.

С осторожностью. Тромбофлебит в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Около 15 г (3 столовые ложки) травы горца птичьего помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при

комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь **взрослые и дети старше 12 лет** по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4-х раз в год) - через 10-12 дней.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Почечная колика. Повышение свертываемости крови.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранят в прохладном месте не более 2 сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gorca_ptichego_Sporysha_trava