

## [Горца птичьего \(Спорыша\) трава](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Горца птичьего трава](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

♦ <b>Сырье растительное измельченное</b>	<b>1 пачка</b>
трава горца птичьего	50 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Настой горца птичьего (спорыша) травы препятствует образованию мочевых камней (уратов). Оказывает диуретическое, противовоспалительное, гемостатическое, умеренное антимикробное действие, повышает сократительную активность матки.

### **Показания к применению:**

Мочекаменная болезнь (в качестве средства, способствующего отхождению мелких конкрементов).

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к препарату; повышенная свертываемость крови, беременность, детский возраст до 12 лет. Наличие в мочевыводящих путях камней, размером более 6 мм.

*С осторожностью.* Тромбофлебит в анамнезе.

### **Способ применения и дозы:**

Около 15 г (3 столовые ложки) травы горца птичьего помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при

## **Горца птичьего (Спорыша) трава**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь **взрослые и дети старше 12 лет** по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4-х раз в год) - через 10-12 дней.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. Почечная колика. Повышение свертываемости крови.

### **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан во время беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранят в прохладном месте не более 2 сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gorca\\_ptichego\\_Sporyscha\\_trava](http://drugs.thead.ru/Gorca_ptichego_Sporyscha_trava)