

Горпилс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и местноанестезирующее действие.

Коагулирует белки микробных клеток; активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Устраняет симптомы раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывает деконгестивное действие на слизистую оболочку.

Уменьшает заложенность носа. Смягчает раздражение и боль в горле.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, горла, гортани:

- тонзиллит;
- фарингит;
- ларингит (в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности);
- охриплость;
- воспаление слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Молочница](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- детский возраст (до 5 лет).

Способ применения и дозы:

Взрослым - каждые 2 ч рассасывать (до полного растворения) по 1 таблетке или пастилке. Максимальная суточная доза - 8 таблеток или пастилок.

Детям с 5 лет - по 1 таблетке или пастилки каждые 4 ч.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Особые указания и меры предосторожности:

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают.

Применение в детском возрасте

Противопоказан: детский возраст до 5 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gorpils>