

## [Грамицидин С \(концентрат\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Грамицидин С](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибактериальное средство, оказывает бактериостатическое (*Streptococcus pneumoniae*, менингококки, гонококки, возбудителей анаэробной инфекции) и в высоких концентрациях бактерицидное действие на *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.*

Повышает проницаемость мембраны микробной клетки для неорганических катионов за счет формирования сети каналов в липидных структурах мембраны, что обуславливает развитие осмотической неустойчивости клетки.

#### **Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике отсутствуют.

### **Показания к применению:**

#### *Водный и жировой раствор*

- гнойные раны;
- пролежни, язвы;
- ожоги;
- остеомиелит;
- травма суставов;
- эмпиема;
- флегмона, карбункул, фурункул (промывание, орошение повязок и тампонов).

#### *Спиртовой раствор*

- пиодермия.

## Грамицидин С (концентрат)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### *В составе комбинированной терапии*

- инфицированная экзема век;
- блефарит;
- мейбомит (ячмень);
- склерит, эписклерит;
- иридоциклит, ирит;
- наружный отит.

### *Таблетки буккальные*

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: острый фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтоз, гингивит, стоматит.

### *Паста*

- местная контрацепция;
- ожоги;
- раны.

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Иридоциклит](#)
- [Ирит](#)
- [Карбункул](#)
- [Контрацепция](#)
- [Мейбомит](#)
- [Ожоги](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Отит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Склерит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Фарингит](#)
- [Флегмона](#)
- [Фурункул](#)
- [Экзема](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эписклерит](#)
- [Ячмень](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- дерматозы (для наружного применения);
- период лактации.

С осторожностью: беременность.

## Способ применения и дозы:

*Местно.* Для приготовления водного раствора 2% раствор разводят в 100-200 раз стерильной дистиллированной или обычной питьевой водой. Для приготовления жирового раствора - 2% раствор разводят касторовым маслом, рыбьим

## **Грамицидин С (концентрат)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

жиром, ланолином в 25-30 раз. Применяют для промывания, орошения повязок, тампонов.

*Для приготовления спиртового раствора* 2% раствор разводят в 100 раз 70% этанолом. При пиодермии смазывают кожу спиртовым раствором 2-3 раза в день.

*Таблетки буккальные.* 3 мг (2 таблетки) одну за другой (с интервалом 20-30 мин) медленно рассасывают в полости рта 4 раза в день; на курс - 15-30 мг.

*Паста для местного применения.* Наносят тонким слоем на пораженную поверхность и накрывают марлевой салфеткой. Повязки меняют через 2-4 дня.

В качестве контрацептивного средства во влагалище специальным шприцем вводят 5-6 г.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, контактный дерматит, при парентеральном введении - гемолиз, флебит.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению в период лактации (грудного вскармливания). При беременности назначают с осторожностью.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Водный раствор грамицидина можно употреблять в течение 3 дней после приготовления. Введение растворов в вену не допускается - возможны гемолиз и развитие флебита.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gramicidin\\_S\\_koncentrat](http://drugs.thead.ru/Gramicidin_S_koncentrat)