

Граммидин



Код АТХ:

- [R02AB30](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Грамицидин С](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 таб.
грамицидин С	1.5 мг (1500 ЕД)

Вспомогательные вещества: сахар, лактоза, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает выраженное противомикробное действие. В высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Повышает проницаемость мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Препарат практически не вызывает привыкания чувствительных к нему микроорганизмов. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Граммидин отсутствуют.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- острый фарингит;
- тонзиллит;
- ангина;
- пародонтоз;
- гингивит;
- стоматит.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

- лактация;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям с 12 лет препарат назначают по 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; **детям до 12 лет** - по 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения составляет 5-6 дней.

Таблетки применяют после еды, рассасывая во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Граммидин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Граммидин противопоказан к применению в период лактации. С осторожностью следует применять препарат при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Граммидин усиливает эффекты других противомикробных средств.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Grammidin>