Граммидин



Код АТХ:

- R02AB30

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Грамицидин С

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 таб.
грамицидин С	1.5 мг (1500 ЕД)

Вспомогательные вещества: сахар, лактоза, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает выраженное противомикробное действие. В высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Повышает проницаемость мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Препарат практически не вызывает привыкания чувствительных к нему микроорганизмов. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Граммидин отсутствуют.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

— острый фарингит;

— тонзиллит;

— ангина;

— пародонтоз;

— гингивит;

— стоматит.

Относится к болезням:

- Ангина
- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— лактация;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям с 12 лет препарат назначают по 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; **детям до 12 лет** - по1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения составляет 5-6 дней.

Таблетки применяют после еды, рассасывая во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Граммидин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Граммидин противопоказан к применению в период лактации. С осторожностью следует применять препарат при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Граммидин усиливает эффекты других противомикробных средств.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin