# <u>Граммидин</u>



### Код АТХ:

• R02AB30

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Грамицидин С

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$ 

#### Форма выпуска:

◊ Таблетки для рассасывания белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 таб.
грамицидин С	1.5 мг (1500 ЕД)

Вспомогательные вещества: сахар, лактоза, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

- 10 шт. упаковки безъячейковые контурные (1) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки безъячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (1) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 10 шт. банки полимерные (1) пачки картонные.
- 20 шт. банки полимерные (1) пачки картонные.

#### Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антибактериальный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает выраженное противомикробное действие. В высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Повышает проницаемость мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Препарат практически не вызывает привыкания чувствительных к нему микроорганизмов. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

#### Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Граммидин отсутствуют.

#### Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:
— острый фарингит;
— тонзиллит;
— ангина;
— пародонтоз;

# Относится к болезням:

- Ангина
- <u>Гингивит</u>
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит

#### Противопоказания:

_	ла	KΤά	ЭШ	ия:

— гингивит;

стоматит.

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям с 12 лет** препарат назначают по 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; **детям до 12 лет** - по1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения составляет 5-6 дней.

Таблетки применяют после еды, рассасывая во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

### Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции.

#### Передозировка:

Данные по передозировке препарата Граммидин не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Граммидин противопоказан к применению в период лактации. С осторожностью следует применять препарат при беременности.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

#### Граммидин

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Граммидин усиливает эффекты других противомикробных средств.

# Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.

# Срок годности:

3 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Grammidin