

[Граммидин с анестетиком](#)



Код АТХ:

- [R02AB30](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Грамицидин С оказывает противомикробное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки. Механизм действия связан с повышением проницаемости мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, проявляющееся непосредственно в момент рассасывания и сохраняющееся в течение 30-40 мин.

Ментол и эвкалиптовое масло уменьшают неприятные ощущения, воспаление и облегчают проглатывание пищи при заболеваниях полости рта и горла. Ментол дополнительно усиливает местноанестезирующее действие лидокаина.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом:

- острый фарингит;
- тонзиллит;
- ангина;
- пародонтит;
- гингивит;

— стоматит.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— период лактации;

— детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью: беременность.

Способ применения и дозы:

Таблетку рассасывают во рту до полного растворения, не разжевывая, после еды. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Доза для **детей старше 12 лет** и **взрослых** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

Побочное действие:

Временная анестезия языка. Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание — период лактации.

С осторожностью: беременность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Не содержит сахара; может применяться у больных с противопоказаниями или ограничениями в приеме сахара и сахаросодержащих препаратов.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 3 лет).

Доза для **детей старше 12 лет** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

Условия отпуска в аптеке:

Граммидин с анестетиком

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin_S_Anestetikom