Граммидин детский



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Грамицидин С
- Цетилпиридиния хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с фаской, с надписью на одной стороне GR и запахом малины; допускается незначительная мраморность.

	1 таб.
грамицидин С (в форме дигидрохлорида)	1.5 мг
цетилпиридиния хлорид (в форме моногидрата)	1 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил 200) 5 мг, тальк 60 мг, лимонной кислоты моногидрат 36 мг, аспартам 12 мг, ароматизатор малиновый 3.6 мг, сорбитол (Neosorb) 1055.9 мг, магния стеарат 25 мг.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
9 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Грамицидин С оказывает антибактериальное (бактерицидное) действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам, подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает противомикробное действие, уменьшает воспаление, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и горла, сопровождающихся болью в горле и в ротовой полости:

— фарингит;

— тонзиллит;

— пародонтит;

— гингивит;

— стоматит.

Относится к болезням:

- Гингивит
- Инфекции
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— фенилкетонурия (препарат содержит аспартам);

— период лактации;

— детский возраст до 4 лет.

Способ применения и дозы:

Местно. Применяется после еды, путем рассасывания во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Дозировка **для детей от 4 до 12 лет:** по 1 таблетке 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 4 таблетки.

Дозировка **для детей старше 12 лет и взрослых:** по 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут) 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).

Передозировка:

Симптомы: прием препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, может вызвать нарушения со стороны ЖКТ вследствие изменения бактериальной микрофлоры: тошноту, рвоту, диарею.

Лечение: следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата. Применение

препарата возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время не описано случаев клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Граммидин детский не следует принимать при наличии открытых ран в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 4 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin_detskiy