

## [Граммидин детский \(спрей\)](#)



### **Код АТХ:**

- R02AA20

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- Грамицидин С
- Цетилпиридиния хлорид

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр МНН](#) [Википедия МНН](#)

[РЛС VITAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Спрей дозированный для местного применения, 0,03 мг + 0,1 мг/доза. По 112 доз во флаконе алюминиевом, снабженном дозирующим устройством со складывающейся канюлей. По 1 фл. в пачке картонной.

### **Состав:**

Спрей для местного применения дозированный	1 доза
<i>активное вещество:</i>	
грамицидина С дигидрохлорид	0,0319 мг
(в пересчете на грамицидин С — 0,03 мг)	
цетилпиридиния хлорид	0,1 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> этанол 96% — 9,5 мг; сукралоза — 0,2 мг; глицерол — 33,2 мг; ароматизатор малиновый — 0,4 мг; лимонной кислоты моногидрат — 0,058 мг; натрия цитрат — 0,022 мг; полисорбат 80 — 0,4 мг; метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) — 0,184 мг; пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен) — 0,02 мг; вода очищенная — до 0,2 мл	

### **Описание:**

Прозрачный или опалесцирующий, бесцветный или с желтоватым оттенком раствор с характерным запахом малины.

**Фармакотерапевтическая группа:**

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

**Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — противомикробное местное, антисептическое.

**Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта.

В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С и антисептическое средство цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Грамицидин С оказывает антибактериальное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам, подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и горла.

Препарат оказывает противомикробное действие, уменьшает воспаление, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание.

**Фармакокинетика**

Активные вещества оказывают местное действие и почти не всасываются из ЖКТ, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

**Показания к применению:**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: ангина; фарингит; тонзиллит; пародонтоз; гингивит; стоматит.

**Относится к болезням:**

- Ангина
- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит

**Противопоказания:**

Детский возраст до 4 лет; I триместр беременности; повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав лекарственного средства.

**Способ применения и дозы:**

Для рассасывания или обработки полости рта. Применяют 1-4 раза/сут, в зависимости от показаний, возраста пациента и лекарственной формы.

Непосредственно после применения следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

**Побочное действие:**

Возможно: в отдельных случаях - аллергические реакции.

## **Передозировка:**

**Симптомы:** применение препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, может вызвать нарушения со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.

**Лечение:** следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение в I триместре беременности.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание на время приема необходимо прекратить.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней применения следует обратиться к врачу.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Grammidin\\_detskiy\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Grammidin_detskiy_sprey)