

## [Граммидин с анестетиком](#)



### **Код АТХ:**

- [R02AB30](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат.

Грамицидин С оказывает противомикробное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки. Механизм действия связан с повышением проницаемости мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, проявляющееся непосредственно в момент рассасывания и сохраняющееся в течение 30-40 мин.

Ментол и эвкалиптовое масло уменьшают неприятные ощущения, воспаление и облегчают проглатывание пищи при заболеваниях полости рта и горла. Ментол дополнительно усиливает местноанестезирующее действие лидокаина.

### **Показания к применению:**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом:

- острый фарингит;
- тонзиллит;
- ангина;
- пародонтит;
- гингивит;

— стоматит.

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— период лактации;

— детский возраст (до 3 лет).

С *осторожностью*: беременность.

## Способ применения и дозы:

Таблетку рассасывают во рту до полного растворения, не разжевывая, после еды. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Доза для **детей старше 12 лет** и **взрослых** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

## Побочное действие:

Временная анестезия языка. Аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание — период лактации.

С *осторожностью*: беременность.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не содержит сахара; может применяться у больных с противопоказаниями или ограничениями в приеме сахара и сахаросодержащих препаратов.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание — детский возраст (до 3 лет).

Доза для **детей старше 12 лет** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

## Условия отпуска в аптеке:

---

## **Граммидин с анестетиком**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Grammidin\\_s\\_anestetikom](http://drugs.thead.ru/Grammidin_s_anestetikom)