Граммидин с анестетиком



Код АТХ:

- R02AB30

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Грамицидин С оказывает противомикробное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки. Механизм действия связан с повышением проницаемости мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. При рассасывании усиливает слюноотделение, способствуя очищению ротоглотки от микроорганизмов и воспалительного экссудата.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, проявляющееся непосредственно в момент рассасывания и сохраняющееся в течение 30-40 мин.

Ментол и эвкалиптовое масло уменьшают неприятные ощущения, воспаление и облегчают проглатывание пищи при заболеваниях полости рта и горла. Ментол дополнительно усиливает местноанестезирующее действие лидокаина.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом:

— острый фарингит;

— тонзиллит;

— ангина;

— пародонтит;

— гингивит;

— стоматит.

Относится к болезням:

- Ангина
- Болевой синдром
- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— период лактации;

— детский возраст (до 3 лет).

С *осторожностью:* беременность.

Способ применения и дозы:

Таблетку рассасывают во рту до полного растворения, не разжевывая, после еды. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Доза для **детей старше 12 лет** и **взрослых** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

Побочное действие:

Временная анестезия языка. Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание — период лактации.

С *осторожностью:* беременность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Не содержит сахара; может применяться у больных с противопоказаниями или ограничениями в приеме сахара и сахаросодержащих препаратов.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 3 лет).

Доза для **детей старше 12 лет** - 2 таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут; для **детей 3-12 лет** - 1-2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 5-6 дней.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin_s_anestetikom