

[Граммидин с анестетиком нео](#)



Код АТХ:

- [R02A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Грамицидин С](#)
- [Оксибупрокаин](#)
- [Цетилпиридиния хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** круглые, двояковыпуклые, с надписью на одной стороне - "GR".

	1 таб.
грамицидин С (в форме дигидрохлорида)	3 мг
оксибупрокаина гидрохлорид	200 мкг
цетилпиридиния хлорид (в форме моногидрата)	1 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (Аэросил), тальк, ацесульфам калия, ароматизатор мятный, сорбитол (Neosorb), магния стеарат.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
9 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С, местноанестезирующее средство - оксибупрокаин и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Анестетик оксibuпрокаин оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта и глотки. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает обезболивающий эффект, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в ЖКТ, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки:

- ангина;
- фарингит;
- тонзиллит;
- пародонтоз;
- гингивит;
- стоматит.

Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- I триместр беременности;
- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут; **детям в возрасте от 4 до 12 лет** - по 1 таб. 1-2 раза/сут.

Таблетки применяют после еды, рассасывая во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции, временная потеря чувствительности языка.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат в I триместр беременности.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат при совместном приеме повышает эффективность других противомикробных средств местного и системного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата пациент должен обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

Детям в возрасте от 4 до 12 лет - по 1 таб. 1-2 раза/сут

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin_s_anestetikom_neo