Граммидин с анестетиком нео



Код АТХ:

- R02A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Грамицидин С
- Оксибупрокаин
- Цетилпиридиния хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** круглые, двояковыпуклые, с надписью на одной стороне - "GR".

	1 таб.
грамицидин С (в форме дигидрохлорида)	3 мг
оксибупрокаина гидрохлорид	200 мкг
цетилпиридиния хлорид (в форме моногидрата)	1 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (Аэросил), тальк, ацесульфам калия, ароматизатор мятный, сорбитол (Neosorb), магния стеарат.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
9 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С, местноанестезирующее средство - оксибупрокаин и антисептическое средство – цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Анестетик оксибупрокаин оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта и глотки. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает обезболивающий эффект, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в ЖКТ, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки:

— ангина;

— фарингит;

— тонзиллит;

— пародонтоз;

— гингивит;

— стоматит.

Относится к болезням:

- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— I триместр беременности;

— детский возраст до 4 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут; **детям в возрасте от 4 до 12 лет** - по 1 таб. 1-2 раза/сут.

Таблетки применяют после еды, рассасывая во рту, не разжевывая. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 ч.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции, временная потеря чувствительности языка.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат в I триместр беременности.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат при совместном приеме повышает эффективность других противомикробных средств местного и системного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата пациент должен обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

Детям в возрасте от 4 до 12 лет - по 1 таб. 1-2 раза/сут

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grammidin_s_anestetikom_neo