

Гриппферон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Интерферон альфа-2b](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный дозированный** в виде прозрачного бесцветного или светло-желтого раствора.

	1 мл	1 доза
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	10000 ME	500 ME

Вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат 0.5 мг, натрия хлорид 4.1 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат 11.94 мг, калия дигидрофосфат 4.54 мг, повидон 8 тыс. 10 мг, макрогол 4000 100 мг, вода очищенная до 1 мл.

10 мл (200 доз) - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием.

Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b - 1-2 ME/мл) и не имеет клинической значимости.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей и взрослых.

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в состав препарата;
- тяжелые формы аллергических заболеваний.

Способ применения и дозы:

При первых признаках заболевания Гриппферон применяют в течение 5 дней:

- в возрасте от 0 до 1 года впрыскивают по 1 дозе (500 МЕ) в каждый носовой ход 5 раз/сут (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза 5000 МЕ);
- в возрасте от 1 до 3 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый носовой ход 3-4 раза/сут (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 6000-8000 МЕ);
- в возрасте от 3 до 14 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый носовой ход 4-5 раз/сут (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 8000-10000 МЕ);
- с 15 лет и взрослым впрыскивают по 3 дозы в каждый носовой ход 5-6 раз/сут (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза 15000-18000 МЕ).

С целью профилактики ОРВИ и гриппа:

- при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат впрыскивают в разовой возрастной дозировке 2 раза/сут однократно;
- при сезонном повышении заболеваемости препарат впрыскивают в возрастной дозировке однократно утром с интервалом 24-48 ч.

При необходимости профилактические курсы повторяют.

Для введения препарата следует снять защитный колпачок, ввести распылительное устройство в носовой ход и сильно нажать на распылительный механизм (1 доза - 1 нажатие). Перед первым применением следует несколько раз нажать на распылительный механизм до появления облачка спрея.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Гриппферон разрешен к применению в течение всего периода беременности. Не имеет ограничений к применению в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с Гриппфероном не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Возможно применение у детей по показаниям.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 8°C.

Вскрытый флакон хранить не более 30 дней. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Grippferon>