Гриппферон С Лоратадином



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Мазь назальная*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

	1 г
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	не менее 10000 МЕ
лоратадин	2 мг

Вспомогательные вещества: борная кислота 1 мг, натрия тетрабората декагидрат 1 мг, глицерол 90 мг, динатрия эдетата дигидрат 1 мг, гипромеллоза 2.5 мг, макрогол 4000 - 200 мг, макрогол 400 - 600 мг, вода очищенная до 1 г.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гриппферон с лоратадином - комбинированный лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим, противовирусным и антигистаминным действием.

Интерферон альфа-2b - иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Лоратадин - блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека слизистой оболочки полости носа.

Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующих веществ, достигаемая в плазме крови, значительно ниже предела обнаружения современными аналитическими методами и не имеет клинической значимости.

Показания к применению:

— профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в составе комплексной терапии у взрослых, в т.ч. у пациентов с аллергическим ринитом.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Грипп
- Инфекции
- ОРВИ
- Ринит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b, лоратадину или другим компонентам препарата;

— детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у детей);

— беременность, период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Интраназально.

Для *лечения гриппа и ОРВИ* 5 раз в день смазывать слизистую оболочку носа, выпустив но 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

Для *профилактики гриппа и ОРВИ* (после контакта с заболевшим) 1 раз в день (утром) смазывать слизистую оболочку носа, выпустив по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

Перед нанесением мази необходимо очистить полость носа, а после нанесения - помассировать крылья носа для лучшего распределения мази по поверхности слизистой оболочки носа.

Побочное действие:

Возможно чиханье, зуд в месте нанесения, временное нарушение обоняния.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных по использованию препарата во время беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с препаратом Гриппферон с лоратадином не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения:

При температуре от 2 до 8°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grippferon_S_Loratadinom