Гриппферон (капли)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Интерферон альфа-2b

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные*** в виде прозрачного, бесцветного или светло-желтого раствора.

	1 мл
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	не менее 10 000 МЕ

Вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат - 0.5 мг, натрия хлорид - 4.1 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 11.94 мг, калия дигидрофосфат - 4.54 мг, повидон 8000 - 10 мг, макрогол 4000 - 100 мг, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы пластиковые с капельницей (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы пластиковые с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием.

Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b - 1-2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости.

Показания к применению:

— профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

Относится к болезням:

- Грипп

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в состав препарата;

— тяжелые формы аллергических заболеваний.

Способ применения и дозы:

При первых признаках заболевания Гриппферон применяют в течение 5 дней:

— **в возрасте от 0 до 1 года** - по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ , суточная доза 5000 МЕ)

— **в возрасте от 1 до 3 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ , суточная доза 6000-8000 МЕ)

— **в возрасте от 3 до 14 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ , суточная доза 8000-10000 МЕ)

— **взрослым** -по 3 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ , суточная доза 15000-18000 МЕ).

С целью профилактики ОРВИ и гриппа:

— при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат закапывают в разовой возрастной дозе 2 раза в день. При необходимости профилактические курсы повторяют;

— при сезонном повышении заболеваемости препарат закапывают в возрастной дозе однократно утром с интервалом 24-48 часов.

После каждого закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Гриппферон разрешен к применению в течение всего периода беременности в соответствии с возрастной дозой.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с Гриппфероном не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применяют детям по показаниям в соответствии с режимом дозирования.

Условия хранения:

При температуре от 2 до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grippferon_kapli