Гриппостад Рино



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные для детей 0.05%*** прозрачные, бесцветные до слегка окрашенных, свободные от видимых инородных частиц, без запаха.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50%, лимонной кислоты моногидрат, натрия цитрата дигидрат, глицерол 85%, вода очищенная.

10 мл - флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ксилометазолин - производное имидазолина, является альфа$_2$-адреностимулятором. Суживает кровеносные сосуды слизистой оболочки полости носа, в результате чего уменьшается отек и гиперемия слизистой оболочки. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Действие наступает через 5-10 мин и продолжается до 10 ч. Не нарушает функцию реснитчатого эпителия слизистой дыхательных путей.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению:

— острый аллергический ринит;

— острые респираторные заболевания с явлениями ринита;

— синусит;

— поллиноз;

— средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);

— подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Острые респираторные заболевания
- Отит
- Поллиноз
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— тахикардия;

— выраженный атеросклероз;

— глаукома;

— атрофический ринит;

— тиреотоксикоз;

— хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применять при сахарном диабете, феохромоцитоме, ИБС (стенокардии), гиперплазии предстательной железы, в период лактации, в детском возрасте до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Интраназально. Для **грудных детей и детей в возрасте до 6 лет**- по 1-2 кап. 0.05% раствора в каждый носовой ход 1 или 2 раза/сут; не следует применять более 3 раз/сут.

Гриппостад Рино не должен использоваться дольше, чем 5 дней, за исключением предписанных врачом случаев. Повторное использование препарата возможно через несколько дней. Длительность терапии определяет врач.

Побочное действие:

Местные реакции: при частом (более 4 раз/сут) и/или длительном применении (более 7 дней) - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция.

Системные реакции: редко - отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение АД, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения, депрессия.

Передозировка:

При правильном применении препарата передозировка препарата невозможна, т.к. препарат при местном применении практически не всасывается. Однако при превышении рекомендуемых доз в несколько раз наблюдается усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Не следует применять в течение длительного времени (более 7 дней), например, при хроническом рините.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью* применять в детском возрасте до 2 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grippostad_Rino