

## [Гриппостад Рино](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли назальные для детей 0.05%** прозрачные, бесцветные до слегка окрашенных, свободные от видимых инородных частиц, без запаха.

	<b>1 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* бензалкония хлорид 50%, лимонной кислоты моногидрат, натрия цитрата дигидрат, глицерол 85%, вода очищенная.

10 мл - флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Ксилометазолин - производное имидазолина, является альфа<sub>2</sub>-адреностимулятором. Суживает кровеносные сосуды слизистой оболочки полости носа, в результате чего уменьшается отек и гиперемия слизистой оболочки. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Действие наступает через 5-10 мин и продолжается до 10 ч. Не нарушает функцию реснитчатого эпителия слизистой дыхательных путей.

#### **Фармакокинетика**

При местном применении практически не всасывается, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

### Показания к применению:

- острый аллергический ринит;
- острые респираторные заболевания с явлениями ринита;
- синусит;
- поллиноз;
- средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);
- подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Отит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- тахикардия;
- выраженный атеросклероз;
- глаукома;
- атрофический ринит;
- тиреотоксикоз;
- хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применять при сахарном диабете, феохромоцитоме, ИБС (стенокардии), гиперплазии предстательной железы, в период лактации, в детском возрасте до 2 лет.

## Способ применения и дозы:

Интраназально. Для **грудных детей и детей в возрасте до 6 лет**- по 1-2 кап. 0.05% раствора в каждый носовой ход 1 или 2 раза/сут; не следует применять более 3 раз/сут.

Гриппостад Рино не должен использоваться дольше, чем 5 дней, за исключением предписанных врачом случаев. Повторное использование препарата возможно через несколько дней. Длительность терапии определяет врач.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* при частом (более 4 раз/сут) и/или длительном применении (более 7 дней) - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция.

*Системные реакции:* редко - отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение АД, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения, депрессия.

## Передозировка:

При правильном применении препарата передозировка препарата невозможна, т.к. препарат при местном применении практически не всасывается. Однако при превышении рекомендуемых доз в несколько раз наблюдается усиление побочных эффектов.

*Лечение:* симптоматическое.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Не следует применять в течение длительного времени (более 7 дней), например, при хроническом рините.

### ***Применение в детском возрасте***

С *осторожностью* применять в детском возрасте до 2 лет.

## **Условия хранения:**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Grippostad\\_Rino](http://drugs.thead.ru/Grippostad_Rino)