

[Гризеофульвин-Фаркос](#)



Код АТХ:

- [D01AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гризеофульвин](#)
- [Салициловая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противогрибковый препарат, действие которого определяется компонентами, входящими в его состав.

Гризеофульвин оказывает фунгистатическое действие на разные виды дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton). Нарушая структуру митотического веретена, подавляет деление грибковых клеток в метафазе. В разной степени накапливается в клетках кожи, волос и ногтей, являющихся предшественниками кератина, делая кератин резистентным к грибковой инвазии. По мере отделения инфицированного кератина происходит замена его здоровой тканью.

Благодаря наличию в составе препарата салициловой кислоты проникает в глубокие слои пораженной кожи и ногтевой пластинки. Обладает также антисептическим и кератолитическим действием, уменьшает зуд, оказывает анальгезирующий эффект.

Не оказывает местнораздражающего действия.

Активные компоненты при местном применении не всасываются и в сосудистое русло не поступают, что определяет практическое отсутствие побочных эффектов, характерных для применения гризеофульвина внутрь.

Показания к применению:

— дерматофитии кожи, волос, ногтей.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 14 лет).

Способ применения и дозы:

Наружно, наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Суточная доза мази не должна превышать 20 г, крема - 30 г.

При *дерматомикозах гладкой кожи* мазь или крем наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в день в течение 2-3 нед, при *микроспории волосистой части головы* - в течение 2-4 нед.

При *онихомикозе* мазь наносят на очищенные пораженные участки ногтей в течение 2 нед ежедневно, а затем 1 раз в 2 дня до полной смены ногтя. При оперативном удалении пораженного ногтя на ногтевое ложе наносят 1 раз в 2 дня (до отрастания здорового ногтя).

Побочное действие:

Аллергические реакции - кожная сыпь (в т.ч. крапивница и эритематозные высыпания).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В период лечения следует избегать приема этанола.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь не рекомендовано назначать с профилактической целью.

В период лечения следует избегать приема этанола.

Лечение должно продолжаться не менее 2 нед после исчезновения клинических симптомов.

При необходимости систематического применения крема требуется наблюдение врача.

Применение в детском возрасте

Применение препарата запрещено у детей в возрасте до 14 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Гризеофульвин-Фаркос

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Grizeofulvin-Farkos>