Гризеофульвин-Фаркос



Код АТХ:

- D01AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гризеофульвин
- Салициловая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противогрибковый препарат, действие которого определяется компонентами, входящими в его состав.

Гризеофульвин оказывает фунгистатическое действие на разные виды дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton). Нарушая структуру митотического веретена, подавляет деление грибковых клеток в метафазе. В разной степени накапливается в клетках кожи, волос и ногтей, являющихся предшественниками кератина, делая кератин резистентным к грибковой инвазии. По мере отделения инфицированного кератина происходит замена его здоровой тканью.

Благодаря наличию в составе препарата салициловой кислоты проникает в глубокие слои пораженной кожи и ногтевой пластинки. Обладает также антисептическим и кератолитическим действием, уменьшает зуд, оказывает анальгезирующий эффект.

Не оказывает местнораздражающего действия.

Активные компоненты при местном применении не всасываются и в сосудистое русло не поступают, что определяет практическое отсутствие побочных эффектов, характерных для применения гризеофульвина внутрь.

Показания к применению:

— дерматофитии кожи, волос, ногтей.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Дерматофития

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 14 лет).

Способ применения и дозы:

Наружно, наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Суточная доза мази не должна превышать 20 г, крема - 30 г.

При *дерматомикозах гладкой кожи* мазь или крем наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в день в течение 2-3 нед, при *микроспории волосистой части головы* - в течение 2-4 нед.

При о*нихомикозе* мазь наносят на очищенные пораженные участки ногтей в течение 2 нед ежедневно, а затем 1 раз в 2 дня до полной смены ногтя. При оперативном удалении пораженного ногтя на ногтевое ложе наносят 1 раз в 2 дня (до отрастания здорового ногтя).

Побочное действие:

Аллергические реакции - кожная сыпь (в т.ч. крапивница и эритематозные высыпания).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В период лечения следует избегать приема этанола.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь не рекомендовано назначать с профилактической целью.

В период лечения следует избегать приема этанола.

Лечение должно продолжаться не менее 2 нед после исчезновения клинических симптомов.

При необходимости систематического применения крема требуется наблюдение врача.

Применение в детском возрасте

Применение препарата запрещено у детей в возрасте до 14 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grizeofulvin-Farkos