Грудной Сбор №4



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**1 пачка**
побеги багульника болотного	20 %
цветки календулы лекарственной	20 %
листья мяты перечной	5 %
цветки ромашки аптечной	20 %
корни солодки голой	15 %
трава фиалки трехцветной	20 %

30 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.
50 г - пачки картонные внутренний пакет из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем.
75 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.
100 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

В комплексной терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет.

Способ применения и дозы:

Около 9 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь до еды в течение 2-3 недель: **взрослые и дети старше 12 лет** - по 1/3 стакана 3 раза в день, **дети от 6 до 12 лет** - по 1-2 столовые ложки 3 раза в день, **дети от 3 до 5 лет** - по 2-3 чайные ложки 3 раза в день.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять во время беременности и в период лактации без согласования с лечащим врачом, в связи с отсутствием достаточных данных клинических наблюдений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3-х лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте!

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grudnoy_Sbor_no4