

## Грудной Сбор №4



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Сбор растительный - сырье измельченное</b>	<b>1 пачка</b>
побеги багульника болотного	20 %
цветки календулы лекарственной	20 %
листья мяты перечной	5 %
цветки ромашки аптечной	20 %
корни солодки голой	15 %
трава фиалки трехцветной	20 %

30 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

50 г - пачки картонные с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем.

75 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

100 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Настой оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

### Показания к применению:

В комплексной терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

### Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет.

## **Способ применения и дозы:**

Около 9 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь до еды в течение 2-3 недель: **взрослые и дети старше 12 лет** - по 1/3 стакана 3 раза в день, **дети от 6 до 12 лет** - по 1-2 столовые ложки 3 раза в день, **дети от 3 до 5 лет** - по 2-3 чайные ложки 3 раза в день.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

## **Передозировка:**

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять во время беременности и в период лактации без согласования с лечащим врачом, в связи с отсутствием достаточных данных клинических наблюдений.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 3-х лет.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте!

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Grudnoy\\_Sbor\\_no4](http://drugs.thead.ru/Grudnoy_Sbor_no4)