

[Грудной сбор №2 \(сбор\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мать-и-мачехи листья](#)
- [Подорожника большого листья](#)
- [Солодки корни](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Сбор растительный - сырье измельченное	100 г
листья мать-и-мачехи	40 г
листья подорожника большого	30 г
корней солодки	30 г
2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.	
Сбор измельченный	100 г
листья мать-и-мачехи	40 г
листья подорожника большого	30 г
корней солодки	30 г
35 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.	
50 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.	

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой сбора обладает отхаркивающим, а также противовоспалительным действием.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудно-отделяемой мокротой (в т.ч. трахеит, бронхит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)

- [Трахеит](#)

Противопоказания:

- эрозивные и язвенные поражения ЖКТ;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

1 фильтр-пакет (2 г) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 - 4 раза/сут после еды в течение 2-3 недель. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Применение лекарственного препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Грудной сбор №2 (сбор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grudnoy_sbor_no2_sbor