Грудной сбор №2 (сбор)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мать-и-мачехи листья
- Подорожника большого листья
- Солодки корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**100 г**
листья мать-и-мачехи	40 г
листья подорожника большого	30 г
корней солодки	30 г

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

◊ ***Сбор измельченный***	**100 г**
листья мать-и-мачехи	40 г
листья подорожника большого	30 г
корней солодки	30 г

35 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.
50 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой сбора обладает отхаркивающим, а также противовоспалительным действием.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудно-отделяемой мокротой (в т.ч. трахеит, бронхит).

Относится к болезням:

- Бронхит

- Трахеит

Противопоказания:

— эрозивные и язвенные поражения ЖКТ;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

1 фильтр-пакет (2 г) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 - 4 раза/сут после еды в течение 2-3 недель. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Применение лекарственного препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Grudnoy_sbor_no2_sbor